

Avifaune du site départemental du Yaudet

Commune de Ploulec'h - Côtes-d'Armor



Bouvreuil pivoine (c) Yann Février

L'avifaune du site du Yaudet

Le site départemental du Yaudet a fait l'objet d'un inventaire du peuplement avifaunistique nicheur au printemps/été 2020. Au total 45 espèces ont été contactées localement, dont 25 nicheuses. L'essentiel du peuplement concerne des espèces communes mais aussi quelques espèces plus caractéristiques d'habitats semi-ouverts (Fauvette des jardins, Bouscarle de Cetti, Bruant zizi) ou d'habitats forestiers (Pic vert, Pic épeiche, Pic épeichette, Roitelet à triple bandeau, Grimpereau des jardins...). Si l'on ajoute les données obtenues en 2020 aux informations extraites des bases naturalistes (GEOCA et Collectif, in www.faune-bretagne.org, 2020), 71 espèces au total ont été observées sur le secteur d'étude depuis 1978. Le site s'inscrit dans un contexte paysager diversifié dominé par des prairies et des secteurs naturels composés de boisements, fourrés et surtout de la baie de la Vierge, exutoire du Léguer. La topographie sur le site est importante, les pentes étant occupées par des boisements et fourrés. Notons la présence de secteurs bâtis et urbanisés à proximité directe de la zone d'étude qui influencent la présence de quelques espèces (Moineau domestique, Verdier d'Europe...).

Intérêts du site pour l'avifaune

- ▶ Peuplement nicheur présentant des espèces patrimoniales inféodées à des milieux spécifiques et localisés
- ▶ Diversité d'habitats favorables à l'avifaune locale (zones ouvertes, zones de boisements arbustifs denses, pentes littorales)
- ▶ Potentialités d'accueil pour l'avifaune en migration ou hivernage (alimentation, reposoir)



En dehors de la période de reproduction

Le site du Yaudet à Ploulec'h pas fait l'objet d'inventaires en dehors de la période de reproduction. Toutefois, il doit abriter un intéressant cortège d'espèces d'habitats ouverts à semi-ouverts hivernantes.

Espèces menacées

Bien que largement distribuée en Côtes-d'Armor, l'avifaune locale présente donc un caractère intéressant de par les statuts des espèces et l'état des populations. Le peuplement mêle diverses communautés et comprend des espèces assez communes mais en régression.



Avifaune du site départemental du Yaudet

Commune de Ploulec'h - Côtes-d'Armor

Niveau d'intérêt et de responsabilité

Niveau Moyen (intérêt départemental). La mosaïque d'habitats dominée par des milieux semi-fermés à fermés engendre une relative homogénéité du peuplement avifaunistique nicheur. 10 espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses considérées comme patrimoniales ont été contactées sur le site. Certaines comme le Roitelet triple-bandeau, le Pic épeichette, le Pouillot fitis et la Buse variable utilisent les milieux boisés en période de nidification. D'autres affectionnent particulièrement les milieux semi-ouverts à l'image du Bouvreuil pivoine, de la Fauvette des jardins, du Chardonneret élégant et de la Bouscarle de Cetti. Le Serin cini et le Verdier d'Europe sont quant à eux plutôt associés aux milieux bocagers et urbanisés présents sur et à proximité du site.

| Espèces localement nicheuses et classées d'intérêt réglementaire | Population locale en 2020 (nombre de couples estimés) | Annexe I Directive Oiseaux (Intérêt européen) | Liste Rouge France (2016) | Liste Rouge Bretagne / Responsabilité Biologique Régionale (2015) | Niveau Enjeu Départemental |
|--|---|---|---------------------------|---|----------------------------|
| Bouscarle de Cetti <i>Cettia Cetti</i> | 3 couples | - | Quasi menacée | Modérée | 4 |
| Bouvreuil pivoine <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | 1 couple | - | Vulnérable | Vulnérable / Elevée | 2 |
| Buse variable <i>Buteo buteo</i> | - | - | - | - / - | 4 |
| Chardonneret élégant <i>Carduelis carduelis</i> | ? | - | Vulnérable | Mineure | 4 |
| Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus</i> | - | - | Quasi-menacée | Modérée | 4 |
| Fauvette des jardins <i>Sylvia borin</i> | Entre 3 et 5 couples | - | Quasi-menacée | Mineure | - |
| Pic épeichette <i>Dendrocopus minor</i> | Entre 0 et 1 couple | - | Vulnérable | Mineure | 4 |
| Roitelet à triple bandeau <i>Regulus ignicapillus</i> | Entre 3 et 4 couples | - | - | Mineure | 4 |
| Serin cini <i>Serinus serinus</i> | 1 couple | - | Vulnérable | Mineure | 4 |
| Verdier d'Europe <i>Carduelis chloris</i> | 1 couple | - | Vulnérable | Mineure | 4 |

UICN & MNHN (2016). Liste rouge des oiseaux menacés en France métropolitaine. Mise à jour 2016. GIP – Bretagne Environnement (2015). Liste rouge des oiseaux menacés en Bretagne. Observatoire Régional de l'Avifaune (2018). Enjeux départementaux pour les oiseaux nicheurs des Côtes-d'Armor. 9 p

Référence : GEOCA (2020). Diagnostic avifaunistique du site départemental du Yaudet. Etat initial du peuplement ornithologique. Année 2020. Conseil Départemental des Côtes-d'Armor. 43p. + annexes.